CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

LXVII. — PLANTES RÉCOLTÉES PAR M. ET Mme LE RAT DE 1900 A 1910[1].

(10e supplément).

PAR A. GUILLAUMIN,

Muséum national d'Histoire naturelle.

Fagara Le Ratii Guillaum. nom. nov. = *Zanthoxylum Le Ratii* Guillaum. — Sans localité (439), bords de la Caricouyé (2448), Prony (218).

F. pinnata Engl. — Nouméa, pointe de l'Artillerie (2347 *bis*).
Geijera salicifolia Schott. — Ile des Pins (117).
***Melicope leptophylla** Guillaum sp. nov.

Arbor 5-6 m. alta, ramis gracilibus, primum dense fulvo villosis, deinde glabris, foliis oppositis, 3-foliolatis, petiolo gracili, 5-7 cm. longo, breviter fulvo-villoso, foliolis membranaceo rigidis, ovatis (usque ad 10 cm. × 5 cm.), supra glabris, subtus breviter hirsutis praecipue in costa, apice acutis, centrali in petiolum longe angustissime cuneato, lateralibus sessilibus, basi asymmetricis, latere exteriore latiore. Flores solitarii vel 2-3 fasciculati, fere sessiles, inaperti 4 mm. longi, sepalis 4, triangularibus, 1 mm. longis, 2 exterioribus, petalis 4, lineari-lanceolatis, 7 mm. longis, glandulosis, staminibus 8, 4 longioribus (6 mm.), 4 brevioribus (5 mm.) sepalis oppositis ; filamentis applanatis, glandulosis, glabris, ovario minimo, 4 lobo, stylo aequilongo, basi hirsuto, stigmate vix dilatato.

Mont Koghi (2949).
Bauhinia Kappleri Sagot. — Nouméa (introduit] (402, 1927).
Acacia spirorbis Labill. — Route Houaîlou-Koua (2435).
Apium Ammi Urb. — Nouméa (2100).
Blumea bifoliata DC. — Magenta (973).
Conyza viscidula Wall. — Plaine de Caricouyé, Païta (2854), base du Mont Mou (1625).

1. *Bull. Mus.*, 1911, pp. 349, 453, 558 ; 1912, pp. 39, 91 ; 1913, p. 380 ; 1919, p. 499 ; 1920, p. 174 ; 1923, p. 112 ; 1926, p. 229 ; 1929, p. 117 ; 1932, p. 694 ; 1934, pp. 302, 456.

Litsea uniflora Guillaum. — Dombéa (3974).
Stenocarpus Comptonii S. Moore. — Bien que l'espèce ne me soit connue que par la description, je crois pouvoir y rapporter l'échantillon : Prony (523).
S. dumbeensis Guillaum. — Mont Dzumac (2652), Monts Koghis (2237) ?
Potamogeton pectinatus L. — Nouméa (49).
Cladium articulatum R. Br. — Dombéa (3976).
Gahnia aspera Spreng. — Nouméa (471), Anse Vata (578).
Scleria neo-caledonica Rendle ? — Prony (355).
Carex brunnea Thunb. — Hienghène (sans n°).
C. indica L. var. *fissilis* Kükenth. — Table Unio (915).
Bulbostylis barbata C. B. Clarke. — Nouméa (222, 771), Hienghène (sans n°).